

SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

Số: 146 /CCCNTY-TY

V/v hướng dẫn sử dụng hóa chất khử trùng phòng,
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Trung tâm nước và Kỹ thuật Nông nghiệp;
- Trạm Kỹ thuật nông nghiệp các khu vực.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SNNMT ngày 12/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong chăn nuôi”; căn cứ loại hóa chất và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn sử dụng hóa chất khử trùng, tiêu độc BENZALDEHYDE trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm có hiệu quả, đúng kỹ thuật; như sau:

1. Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng thuốc hóa chất khử trùng tiêu độc

- Loại hóa chất sát trùng sử dụng: BENZALDEHYDE
- Thành phần: Trong 1 lít dung dịch hóa chất khử trùng, tiêu độc có chứa:
 - + Glutaraldehyde.....285g
 - + Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride.....100g
 - + Dung môi vừa đủ 1000ml
 - + Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất;
- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần công nghệ sinh học thú y.
- Nhà phân phối: Công ty Cổ phần đầu tư BBE Việt Nam.

2. Cách sử dụng:

- Khi phun phòng dịch: Pha loãng 1/400 - 500 (20 – 25 ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt). 01 lít dung dịch pha phun cho 4 – 5m² nền chuồng (tức là 1 lít dung dịch BENZALDEHYDE pha loãng với 400 lít nước sạch, phun cho 2.000 m² diện tích bề mặt).

- Khi phun chống dịch: Pha loãng 1/250 - 300 (33 – 40ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt, 1 lít dung dịch pha phun cho 2 - 3m² nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch ((tức là 1 lít dung dịch BENZALDEHYDE pha loãng với 300 lít nước sạch, phun cho 900m² diện tích bề mặt).

- Tiêu độc phương tiện vận chuyển, sát trùng lò ấp, máy ấp trứng: 20ml thuốc sát trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên xe vận chuyển, lò ấp.

- Khử trùng trứng: 10ml thuốc sát trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 lít nước sạch.

- Khử trùng nước: 5ml thuốc/ 10 lít nước.

- Tiêu độc xác súc vật chết, phân súc vật, hổ sát trùng: 70ml thuốc sát trùng BENZALDEHYDE pha trong 10 lít nước sạch, phun ướt đều xác thú chết, phân súc vật.

3. Một số lưu ý khi sử dụng hóa chất khử trùng, tiêu độc:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hóa chất khử trùng, tiêu độc trước khi dùng.

- Bảo quản hóa chất khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên nhãn mác.

- Người tham gia vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêu độc trước và sau phải tuân thủ nghiêm cá biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh và phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp.

- Việc phun hoá chất chỉ được thực hiện sau khi đã vệ sinh cơ giới như quét dọn, thu gom phân rác, cọ rửa sạch, đã khô; không phun hoá chất khi trời mưa, khi trời đang nắng nóng.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Phòng Thú y) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng nghiệp vụ Chi cục;
- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Bến